



LA CARIE DU PATISSIER


www.presta-asso.fr

La carie dentaire professionnelle, ou « carie du pâtissier », touche principalement les boulangers, pâtisseries, chocolatiers et confiseurs, avec une tranche d'âge à **risque accru qui se situe entre 18 et 30 ans.**



Développement de la carie en 4 étapes

1. Destruction de l'émail sans apparition de signes douloureux
2. Atteinte de la dentine avec apparition de réactions douloureuses au chaud et au froid
3. Atteinte de la pulpe dentaire avec apparition des douleurs spontanées et violentes (c'est la classique « rage de dent »)
4. Destruction de la pulpe dentaire avec prolifération bactérienne autour de la dent. C'est la phase de l'infection dentaire, voire de l'abcès.



Spécificités de la carie dentaire professionnelle

Elle est **indolore** et peut donc évoluer sans que l'on s'en rende compte, si l'on ne se fait pas surveiller par un dentiste,

Elle concerne souvent les dents antérieures, dites « **dents du sourire** » (incisives, canines),

Elle est située sur la face lisse de la dent et/ou sur le collet (partie à la jonction avec la gencive).

Facteurs de risques

Manipulation des sucres sous forme molle et collante,

Habitude de goûter fréquemment les mets préparés,

Tamisage du sucre glace,

Cuisson du sucre,

Aspiration des cornets pour les déboucher,

Brossage irrégulier des dents,

Visites irrégulières ou inexistantes chez le dentiste.



Prévention de la carie du pâtissier

Informier les personnes exposées au sucre,

Se brosser les dents en fin de poste,


Ne pas goûter les préparations sucrées plus que nécessaire,

Être **vigilant lors du tamisage** du sucre glace,

Se rendre **tous les 6 mois chez un chirurgien-dentiste** et lui préciser la formation professionnelle suivie ou le métier exercé.



A vous de jouer !



Pour en savoir plus

L'équipe médicale de santé au travail peut être contactée pour tout **souci de santé en rapport avec le travail**, même pendant un arrêt de travail.